

Vertalen-L 12%

Reg. SAGARPA Q-0088-048



Solución inyectable
Antihelmíntico de amplio espectro

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Clorhidrato de levamisol 12 g

*Vitamina B12 como indicador.

Vehículo cbp 100 mL

USO EN: Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una solución inyectable de levamisol, antihelmíntico de amplio espectro, que actúa sobre estados larvarios y adultos de parásitos gastrointestinales y pulmonares.

El levamisol, interfiere selectivamente con los procesos energéticos (metabolismo de los carbohidratos) del parásito, provocándoles parálisis y posteriormente la muerte.

INDICACIONES: Para el tratamiento de parasitosis pulmonares y gastroentéricas como las ocasionadas por: *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Hyostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomun spp.*, *Chabertia spp.*, *Ascaris spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Metastrongylus spp.*, *Muellerius spp.* y aun aquellos resistentes a otros antiparasitarios. La fórmula de VERTALEN-L 12% permite el tratamiento de los animales jóvenes, débiles o hembras gestantes. En animales inmunodeprimidos incrementa las defensas y cuando se aplica 7 días antes o al mismo tiempo que la vacunación, se obtienen mejores resultados al mejorar la respuesta inmune.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

DOSIS:

Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 20 Kg de peso (nematodos gastrointestinales).

Porcinos: 1 mL por cada 16 Kg de peso (nematodos pulmonares).

ADVERTENCIAS: No deberá usar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano, ni industrializar la leche procedente de los animales tratados con este producto, hasta 3 días después del último tratamiento. No aplicar más de 15 mL en un mismo sitio. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:

- Frasco con 100 mL.
- Frasco con 500 mL.