

Vedicaína 2%

Reg. SAGARPA Q-0088-127



Solución inyectable

Anestésico local**FÓRMULA:**

Cada 100 mL contienen:

Lidocaína	2 g
Vehículo cbp	100 mL

USO EN: Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos,
Porcinos, Caninos y Felinos.**CARACTERÍSTICAS:** Anestésico local que actúa de manera directa en los nervios para producir pérdida localizada y temporal de la sensibilidad y capacidad motora. El bloqueo que producen los anestésicos locales son reversibles. Los anestésicos locales se administran buscando un efecto local o regional; de esta manera la vía de administración que se elija y la correcta técnica de aplicación determinará el inicio del efecto deseado de insensibilidad al dolor.**INDICACIONES:** Es un anestésico local, que contiene lidocaína, la cual pertenece al grupo de las amidas, esta indicada en: anestesia conductiva, bloqueo nervioso, anestesia de infiltración, intervenciones quirúrgicas menores, maniobras obstétricas. Posee efectos sedantes, analgésicos y anticonvulsivos.**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea, epidural e intraarticular.**DOSIS:**

Anestesia epidural:

Equinos	6 a 10 mL.
Bovinos	5 a 15 mL.
Ovinos y Caprinos	3 a 10 mL.
Porcinos	10 a 20 mL.
Caninos y Felinos	1 mL por cada 4.5 Kg de peso.

Anestesia local: Aplicar por vía subcutánea de 0.1 a 0.15 mL/Kg de peso (equivalente a 2-3 mg /Kg de peso).**Anestesia intraarticular:** En equinos de 3 a 20 mL.**ADVERTENCIAS:** Aplicar el producto bajo condiciones de asepsia. No exceder la dosis recomendada. No usar este producto 6 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No consumir la leche procedente de los animales tratados con este producto hasta 96 horas después del último tratamiento. No usar este producto en equinos destinados al consumo humano. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni de los animales domésticos.**PRESENTACIÓN:**

- Frasco con 50 mL.