Oximicina-L

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0088-037

Solución inyectable

Antibiótico de amplio espectro

FÓRMULA:

Cada mL contiene

Clorhidrato de Oxitetraciclina	50.0 mg
Vehículo cbp	1.0 mL

ESPECIES: Bovinos y caprinos (productores de carne y de leche), equinos (no destinados para el consumo humano), porcinos, ovinos, aves de engorda, postura y combate; caninos, felinos y lepóridos.

CARACTERÍSTICAS: Es un antibacteriano de amplio espectro, que actúa contra bacterias grampositivas y gramnegativas. Útil para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias y protozoarios.

INDICACIONES: **Oximicina-L®**, es eficaz en el tratamiento de enfermedades como pasteurelosis, neumonías, leptospirosis, artritis infecciosa, actinobacilosis, mastitis, metritis, edema maligno, carbón sintomático, ántrax, anaplasmosis, erisipela, listeriosis, neumonía enzoótica, síndrome MMA. En aves es eficaz en: ERCC y coriza infecciosa, provocadas por bacterias sensibles a la oxitetraciclina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta, intramuscular, intraperitoneal y subcutánea.

DOSIS:

Especies	mL/kg de peso	Equivalente de clorhidrato de oxitetraciclina/kg de peso
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos	1.0 mL/10.0 kg Cada 12 horas durante 3 a 5 días	5.0 mg/kg
Caninos y felinos	1.0 mL/5.0 kg Vía IM o IV cada 12 horas	10.0 mg/kg
Aves de engorda, postura y combate	0.5-1.0 mL/kg Vía IM, preferentemente en la pechuga, cada 12 horas durante 3 a 5 días	25.0-50.0 mg/kg
Lepóridos	3.0 mL/5.0 kg Vía SC o IM cada 8 horas	30.0 mg/kg

ADVERTENCIAS: No deberá usarse este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No usar para consumo humano, ni industrializar la leche procedente de las vacas tratadas con este producto hasta 50 horas después del último tratamiento. No se administre a equinos destinados al consumo humano. No deberán consumirse los huevos y carne de aves hasta 9 días después del último tratamiento. No se deje al alcance de los niños ni de animales domésticos. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol.

PRESENTACIÓN:

- Frasco con 50 mL.
- Frasco con100 mL.
- Frasco con 500 mL.