

Megluxyn-V

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0088-120



Solución inyectable

Antiinflamatorio, analgésico, antipirético no esteroide de potente acción

FÓRMULA:

Cada 1.0 mL contiene:

Flunixin meglumine 50.0 mg

Vehículo cbp 1.0 mL

ESPECIES: Bovinos y caprinos (productores de carne y de leche), equinos (no destinados al consumo humano), porcinos, ovinos, caninos y felinos.

CARACTERÍSTICAS: Antiinflamatorio, analgésico, antipirético que actúa inhibiendo la formación de prostaglandinas y tromboxanos en cualquier situación que agreda a los tejidos sin importar el origen (infeccioso, físico, químico o alérgico).

INDICACIONES: **Megluxyn-V®**, es útil en padecimientos en los que se requiera combatir el dolor, la inflamación o la fiebre, como en los casos de inflamación o dolor en sistema músculo-esquelético, inflamación aguda asociada a neumonías, mastitis (síndrome mastitis, metritis, agalactia), dolor visceral, en el tratamiento postquirúrgico para contrarrestar los signos propios de enfermedades infecciosas como septicemias y diarreas. Este producto en comparación con la fenilbutazona tiene una actividad 4 veces mayor en caballos cuando existe hinchazón o cuando hay laminitis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o intravenosa.

DOSIS:

Especie	mL/kg de peso	Equivalente de flunixin meglumine/kg de peso
Bovinos	2.0 mL/45.0 kg/5 días/Vía IV	2.2 mg/kg
	1.0 a 2.0 mL/45.0 kg/1-3 días/Vía IM	1.1-2.2 mg/kg
Equinos	1.0 mL/45.0 kg/< 5 días/Vía IV	1.1 mg/kg
	2.0 mL/45.0 kg/< 5 días/Vía IM	2.2 mg/kg
Porcinos	0.9 a 1.8 mL/45.0 kg/2 días/Vías IV, IM	1.0-2.0 mg/kg
Ovinos y caprinos	1.0 mL/45.0 kg/< 5 días/Vía IV	1.1 mg/kg
Caninos	0.2 mL/10.0 kg/3 días/Vías IV, IM	1.0 mg/kg
Felinos	0.1 mL/10.0 kg/5 días/Vía IM	0.5 mg/kg

ADVERTENCIAS: No utilizar este producto 24 horas, en el caso de los bovinos ni 21 días, en el caso de porcinos antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de los animales tratados hasta 5 días después de la última aplicación. No administrar en equinos destinados al consumo humano. Hay equinos que pueden presentar hipersensibilidad a este producto, en este caso los signos son pasajeros y no es necesario dar tratamiento alguno. No mezclar con otros fármacos en la misma jeringa. No se deje al alcance de los niños ni de animales domésticos. Consérvese a no más de 30.0°C, en un lugar seco y al resguardo del sol.

PRESENTACIÓN:

- Frasco con 25 mL.
- Frasco con 50 mL.
- Frasco con 100 mL.
- Frasco con 250 mL.