

# Vitamin Plus

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0088-135



Solución inyectable  
**Vitámico reconstituyente**

## FÓRMULA:

Cada 1.0 mL contiene:

Acetato de sodio	2.50 mg
Cloruro de calcio	0.15 mg
Cloruro de potasio	0.20 mg
Dextrosa anhidra	50.0 mg
DL-fenilalanina	0.03 mg
DL-isoleucina	0.02 mg
DL-triptófano	0.01 mg
DL-valina	0.05 mg
D-pantenol	0.05 mg
Glutamato monosódico	0.04 mg
Clorhidrato de L-arginina	0.03 mg
Clorhidrato de L-cisteína	0.01 mg
Clorhidrato de L-histidina	0.01 mg
L-leucina	0.04 mg
Clorhidrato de L-lisina	0.03 mg
L-metionina	0.01 mg
L-treonina	0.02 mg
Nicotinamida	1.50 mg
Clorhidrato de piridoxina	0.10 mg
Sulfato de magnesio	0.20 mg
Clorhidrato de tiamina	0.10 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	30.0 mcg
Vitamina B2 (riboflavina 5 fosfato sódico)	0.04 mg
Vehículo cbp	1.0 mL

**ESPECIES:** Bovinos y caprinos (productores de carne y leche), equinos (no destinados para consumo humano), porcinos, ovinos, caninos, felinos y aves de engorda.

**CARACTERÍSTICAS:** Es un reconstituyente sérico, energético y rehidratante a base de aminoácidos, dextrosa, electrolitos y vitaminas, gracias a que estos componentes intervienen como reguladores del

metabolismo celular y estimulantes de los procesos metabólicos del organismo.

**INDICACIONES:** **Vitamin Plus®**, aporte de aminoácidos, electrolitos y vitaminas del complejo B, indicado para animales convalecientes o enfermos que han presentado vómito, deshidratación, diarrea; en casos de enfermedades crónicas en las que se requiere de un rápido aporte de vitaminas, minerales, aminoácidos y carbohidratos, en estos casos es necesario administrar simultáneamente la reposición de líquidos por vía oral o inyectable.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraperitoneal y oral.

## DOSIS:

**Animales adultos, bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos:** 2.0 a 6.0 mL por kg de p.c.

**Animales jóvenes:** 4.0 a 6.0 mL por kg de p.c.

**Aves de engorda:** 500.0 mL por cada 1,000.0 litros de agua.

Administrar cada 8 horas según la gravedad del caso y de acuerdo al juicio del Médico Veterinario.

**ADVERTENCIAS:** Cuando se administre por vía intravenosa debe administrarse lentamente para evitar el riesgo de choque. Consérvese a no más de 30.0°C, en un lugar seco y al resguardo del sol. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

## PRESENTACIÓN:

- Frasco de 500 mL.