

Flu V Pen

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0088-061



ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

Polvo para reconstituir inyectable

Mezcla concentrada de antibióticos y corticosteroide

FÓRMULA:

Cada mL de producto reconstituido contiene:

Penicilina G procaínica	150,000 UI
Penicilina G sódica	50,000 UI
Estreptomina base	100.0 mg
Dihidroestreptomina base	100.0 mg
Flumetasona	0.0625 mg
Vehículo cbp	1.0 mL

ESPECIES: Bovinos y caprinos (productores de carne y de leche), equinos (no destinados para consumo humano), porcinos, ovinos, caninos y felinos.

CARACTERÍSTICAS: Combinación de antibióticos para reconstituir con diluyente estéril, de acción rápida y efecto prolongado. La penicilina G en la mayoría de las especies tiene un 50.0 % de unión a las proteínas plasmáticas y muy buena distribución del sitio de aplicación, después de su absorción su vida media de eliminación es muy rápida. En el caso de los aminoglucósidos, se unen muy poco a las proteínas plasmáticas, por actuar sobre la membrana tienen efecto bactericida. Se destaca la sinergia penicilina-estreptomina reforzando el espectro contra bacterias causantes de enfermedades de importancia en los animales domésticos. La actividad de los antibióticos se ve favorecida por la acción de la flumetasona, que posee por sí misma propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y gluconeogénicas.

INDICACIONES: Flu V Pen®, es de utilidad para el tratamiento de las infecciones de los animales en las cuales se requiere la acción inmediata de la Penicilina G sódica y el efecto prolongado de la Penicilina G procaína. La Flumetasona por su acción antiinflamatoria favorece la penetración de los

antibióticos hasta el foco mismo de la infección, con lo que se logra un efecto inmediato y una recuperación más rápida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda exclusivamente, agitando bien la suspensión antes de su aplicación.

DOSIS:

De 10,000 a 20,000 UI por kg de peso (equivalente a 1 mL por 10 a 20 Kg de peso corporal), administrar durante 3 a 5 días.

ADVERTENCIAS: No usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No utilizar para consumo humano ni industrializar la leche procedente de los animales tratados con este producto hasta 3 días después del último tratamiento. No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano. No dejar este producto al alcance de los niños ni de animales domésticos. Consérvese a no más de 30.0°C, en un lugar seco y al resguardo del sol.

PRESENTACIÓN:

- Frasco de 1 MUI.
- Frasco de 2 MUI.
- Frasco de 4 MUI.
- Frasco de 6 MUI.